

Farmaci cortisonici, contraccettivi, tiroidei

Farmaco	Rapporto Latte/Plasma (M/P)	Biodisponibilità orale (%)	Picco plasmatico (ore)	Legame proteine plasmatiche (%)	Giudizio (AAP, H, W)
Beclometasone dipropionato	-	-	-	87	Abbastanza sicuro, può essere dato ai neonati
Betametasona	-	72	1-3	64 ± 6	Moderatamente sicuro, emivita nel latte 5.6 ± 8h
Clogestone	-	-	-	-	Abbastanza sicuro, contraccettivo
Ciclosporina	0.17 – 0.4	2 -98	1 -8	91 - 98	Moderatamente sicuro (H), controindicato (AAP)
Desametasone	escreto	53 ± 40	-	68 ± 3	Moderatamente sicuro
Insulina	Non escreto	-	-	5	Sicuro
Metimazolo	0.3 – 1.28	93	1.5 ± 0.5	0	Moderatamente sicuro
Prednisone	0.05 – 0.25	80 ± 11	-	75 ± 2	Abbastanza sicuro, attenzione se uso cronico
Propiltiouracile	0.1 – 0.77	78 ± 15	-	8	Abbastanza sicuro, controllare ormoni tiroidei neonato in inizio terapia e 6 settimane dopo

BIBLIOGRAFIA:

Titolo:

LA PROMOZIONE DELL'ALLATTAMENTO AL SENO

Autore:

ARTURO GIUSTARDI

Anno di Pubblicazione: SETTEMBRE 2005

Prezzo: EURO 30,00