

Farmaci radioattivi

Farmaco	Rapporto Latte/Plasma (M/P)	Biodisponibilità orale (%)	Picco plasmatico (ore)	Legame proteine plasmatiche (%)	Giudizio (AAP, H, W)
Rame 64	-	12.7		-	Sospendere momentaneamente allattamento
Diatrizoato meglumina	Non escreto	scarsa	-	< 5	sicuro
Fluoresceina	0.5	99	-	-	Moderatamente sicuro
Gadopentetico acido (gadolinio)	Non escreto	0.80	immediato	-	Abbastanza sicuro
Gallio 67	escreto	-	-	-	Sospendere per 72 h allattamento
Indio 111	-	2.8 gg	immediato	-	Sospendere momentaneamente allattamento
Iodio 123 (e/o hippuran)	-	-	-	5 ± 1.9	Sospendere momentaneamente allattamento, emivita nel latte 3.5 gg
Iodio 125	escreto	-	-	-	Sospendere momentaneamente allattamento, emivita nel latte 2 settimane

BIBLIOGRAFIA:

Titolo:
 LA PROMOZIONE
 DELL'ALLATTAMENTO AL SENO
 Autore:
 ARTURO GIUSTARDI
 Anno di Pubblicazione: SETTEMBRE 2005
 Prezzo: EURO 30,00